

TIL LÆGEN

Ætiologi: *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Capnocytophaga canimorsus*, *Clostridium tetani*, *Bartonella henselae*.

BEHANDLING VED BIDSÅR

Antibiotikaprofylakse ved bidsår anbefales i følgende tilfælde:

- Alle håndlæsioner
- Knogle-, led-, eller sene-læsioner
- Knusningslæsioner
- Dybe, skarpe bid, alvorlige bidsår
- Hos immunsvækkede personer

Overvej konference med ortopædkirurg/ mikrobiolog ved knogle-, led- eller senelæsioner samt knusningslæsioner.

Antibiotika-profylakse inden for de første 8 timer

Voksne: Ved dyrebid :
Phenoxymethylpenicillin 1 mill. IE eller 800 mg p.o. x 4 i 3 dage.

Nyeste viden på området: Ugeskrift for læger, statusartikel d. 24.05.2021
"Bidsår fra hunde, katte og mennesker". Anbefalet førstevalg til behandling af bidsår fra hund og kat = *phenoxymethylpenicillin* Alternativt behandlingsvalg = *amoxicillin* / *clavulansyre*
OBS: Forebyggelse/behandling mod stivkrampe.

Ved etableret infektion:

OBS: Lav tærskel for henvisning til hospital.

Voksne: Ved dyrebid:
Phenoxymethylpenicillin eller benzylpenicillin
1 mill. IE eller 800 mg p.o./i.v. x 4 i 10 dage.

Ved penicillinallergi:
Konferér med klinisk mikrobiolog.

Undersøgelse og kontrol:

Grundig rensning af sår og fjernelse af inficeret/dødt væv. D+R fra alle inficerede sår.
Husk tetanusprofylakse.

Kilde: Bidsår - sundhed.dk (for fagpersonale),
opdateret d. 02.05.2023

DYRENES BESKYTTELSE

BID FRA KATTE

Vejledning til, hvordan man bør forholde sig, hvis uheldet er ude og man bliver bidt af en kat



Medbring denne folder som information til lægen

DYRENES BESKYTTELSE

Dyrenes Beskyttelse er en forening, der samler alle, der holder af dyr, så vi sammen kan skabe bedre vilkår for dyrene. Det har Dyrenes Beskyttelse gjort siden 1875, og det vil vi blive ved med, for dyrene fortjener et ordentligt liv.

Sammen kan vi sikre, at dyr bliver respekteret og får mulighed for at leve efter deres naturlige behov.

Dyrenes Beskyttelse, Buddingevej 308, 2860 Søborg, Tlf. +45 3328 7000, Mail db@dyrenesbeskyttelse.dk
dyrenesbeskyttelse.dk



HVORFOR KAN KATTEBID VÆRE FARLIGE?

Katte er udstyret med en stor mængde forskellige bakterier i munden, især på og omkring tænderne. Nogle af disse bakterier er farlige, og bliver man bidt så der går hul på huden, vil nogle af disse bakterier komme ind i såret. Sårene ser ofte harmløse ud, da stiksårene fra hjørnetænderne ikke er store, og sårene ofte lukker i huden, men sårene kan være meget dybe. Dermed bliver bakterier lukket inde i såret med risiko for komplikationer, hvis det ikke behandles rettidigt og korrekt.

Bakterierne fra kattens mund vil ofte give en betændelsestilstand, hvor huden hæver op, bliver rød og meget øm. Op mod 60 % af alle sår der skyldes kattebid ender med at blive betændte.

I værste tilfælde kan bidsår ende med at give livstruende blodforgiftning eller med at betændelsen i såret bliver så voldsom at en amputation er nødvendig for, at bakterierne ikke spreder sig videre rundt i kroppen. Betændelse kan udvikles inden for få timer efter at man er blevet bidt.

SITUATIONER HVOR DER ER ØGET RISIKO FOR BID

Som udgangspunkt opsøger katte ikke mennesker med henblik på at bide dem. Man skal dog være opmærksom på, at leg med killinger og voksne katte kan ende med bid.

De situationer hvor der er specielt øget risiko for bidskader, er ved håndtering af skræmte, utrygge og stressede katte, samt katte der er kommet til skade og derfor har smerter.

I disse situationer er det vigtigt, at passe godt på sig selv, være ekstra omhyggelig med håndteringen af katten under indfangning/flytning, og bruge hjælpemidler der beskytter en mod bid. Dette kan være tykke læder håndteringshandsker, selvom brug af disse ikke giver garanti for, at katten ikke kan bide igennem.

NÅR UHELDET ER UDE

I tilfælde af bid, er det vigtigt at tage situationen alvorligt. Kontakt straks egen læge, vagtlæge eller skadestue, så der kan iværksættes en forebyggende behandling, således at en ukontrolleret betændelse ikke får mulighed for at udvikle sig.

Behandlingen har bedst effekt, hvis behandlingen sættes i gang senest 6 timer efter

ET FORHOLD, MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR MAN OMGÅS KATTE, ER:

Bid fra katte, hvor tænderne går igennem huden, kan udvikle sig til et sår med betændelse og efterfølgende alvorlige komplikationer.

man fik bidsåret, og der kræves en særlig opmærksomhed hvis biddet er tæt på eller i et led.

NÅR DU ER BLEVET BIDT

- Skyl såret grundigt i rindende vand
- Kontakt egen læge eller vagtlægen
- Find dato for sidste stivkramp vaccination
- Medbring denne folder til lægen

EFTER DU HAR VÆRET TIL LÆGEN

- Kontakt nærmeste leder
- Kredsformænd/kredsassistenter → områdeformand/DB dyrlæge
- Dyrereddere → dyreredningskoordinator
- plejefamilier/frivillige på internater → internatsleder
- Ansatte → nærmeste leder
- Kontakt områdeformand eller DB dyrlæge for at få oprettet en skadesanmeldelse
- Kontakt evt. eget forsikringsselskab
- Alle frivillige i foreningen er forsikret

